COMPOSIÇÃO: Brodifacume 0,0025 %.
TIPO DE PRODUTO: TP 14 – Rodenticidas.
ADVERTÊNCIAS DE PERIGO: H373: Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.
RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA: P102: Manter fora do alcance das crianças. P301+P310:EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P314: Em caso de indisposição, consulte um médico. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente, assim como os animais mortos, como um resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor, por gestor autorizado de resíduos.
ORGANISMOS ALVO: Ratos e Ratazanas (Juvenis e adultos (*Rattus norvegicus e Mus musculus*).
MÉTODOS DA APLICAÇÃO: Isco em pasta pronto a usar. Colocar no interior de estações de isco resistentes, invioláveis e devidamente rotuladas. Providenciar o mesmo nível de proteção para humanos e animais não alvo do produto.
CAMPOS DE UTILIZAÇÃO: Interior e envolvente de edifícios.
Ratos (Interior e em redor dos edifícios): Estações de isco com 20-40g de produto a cada ponto. Ratazanas (Interior e em redor dos edifícios): Estações de isco com 100-200g de produto a cada ponto. Em ambos os casos, se for necessário mais de uma estação de isco, a distância mínima entre cada ponto é de 5 metros.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Uso doméstico. Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo e qualquer outra informação que acompanhe o produto ou tenha sido providenciada no ponto de venda e seguir as instruções apresentadas. Antes da utilização do produto, devem ser considerados métodos de controlo não químicos, por exemplo: ratoeiras. Recomenda-se o uso de luvas de proteção. Utilizar em estações de isco invioláveis e fixas ao pavimento ou outra estrutura. Recarregar as estações quando necessário. Não abrir as bolsas contendo o isco. As estações de isco devem ser colocadas nas zonas próximas onde a atividade do roedor foi observada (por exemplo, caminhos, locais de nidificação, buracos, tocas, etc.). Colocar as estações de isco fora do alcance das crianças, pássaros, animais de estimação ou outros animais não-alvo do produto. Colocar as estações de isco afastadas de alimentos, bebidas, rações, assim como de utensílios ou superfícies que possam estar em contacto. Remover alimentos facilmente alcançáveis pelos roedores (por exemplo: grãos ou resíduos de alimentos). Para além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois perturba a população de roedores e dificulta o consumo dos iscos. Durante o manuseamento do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e as áreas de pele expostas, após aplicação do produto. As estações de isco devem ser visitadas pelo menos a cada [2 a 3 dias para ratos] e [5 a 7 dias para ratazanas] no início do tratamento e depois semanalmente, de forma a verificar se o isco é aceite, se o isco está intacto e para remover os corpos dos roedores. Não colocar estações de isco perto de sistemas de drenagem de águas, onde possa entrar em contacto com água. Colocar as estações de isco em áreas não suscetíveis de inundação. Substituir os iscos que tenham sido danificados pela água ou contaminados com sujidade. Remover o restante isco ou estações de isco no final do tratamento.
MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO: Considerar medidas de controlo preventivo (tapar aberturas, remover alimentos e bebidas para o mais longe possível), melhorando a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinfestação. Não usar o produto como iscos permanentes (por exemplo, para prevenir o aparecimento de roedores ou detetar a atividade de roedores). O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis. Os utilizadores devem rotular devidamente as estações de isco com as seguintes informações: "não mover ou abrir"; "contém rodenticida"; "nome e autorização do produto"; "identificação da substância ativa" e "em caso de incidente, contactar o Centro de Informação Antiveneno, Tel. 800 250 250". O produto não deve ser utilizado por mais de 35 dias sem ser realizada uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento. Em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento, o utilizador deverá consultar o fornecedor do produto ou serviço de controlo de pragas. Procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento, pelo menos quando as estações de isco são verificadas.
DETALHES SOBRE OS EFEITOS DIRETOS OU INDIRETOS PROVÁVEIS, INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS: O produto contém uma substância anticoagulante. Se ingerido, os sintomas podem fazer-se evidentes num prazo de 72 horas. As manifestações podem incluir hemorragia nasal e das gengivas. Em situações mais graves, pode surgir hematomas ou sangramento nas fezes e na urina.
Antídoto: Vitamina K1 administrada por um médico/veterinário.
Em caso de contacto com a pele, lavar a pele com água e de seguida com água e sabão. Em caso de contacto ocular, lavar os olhos com água ou com líquido dos olhos, mantendo as pálpebras abertas, durante pelo menos 10 minutos. Em caso de ingestão, enxaguar a boca com água cuidadosamente. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vómito.
NÃO DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.
SE NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA DISPONÍVEL O RÓTULO OU A EMBALAGEM DO PRODUTO E CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL: 800 250 250).
Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal. Perigoso para a vida selvagem.
No contacto com o Centro de Informação Antivenenos, informar o nº de autorização do produto, o nome comercial do produto e a substância ativa. Se possível, providenciar uma cópia do rótulo ou da ficha de dados de segurança.
INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO: No final do tratamento, eliminar os iscos não consumidos e a embalagem em conformidade com a regulamentação em vigor. Eliminar as estações de isco, no fim do seu tempo de vida útil, como resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor. Recomenda-se o uso de luvas de proteção.
INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM: Armazenar o produto na sua embalagem original, fechada, em local fresco, seco e bem ventilado e afastado da luz direta do sol. Armazenar em local afastado das crianças, pássaros, animais domésticos e outros animais. Prazo de validade: 24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES: Devido ao seu modo de ação demorado, os rodenticidas anticoagulantes levam 4-10 dias para serem eficazes após o consumo do isco. Os roedores podem ser portadores de doenças. Não mexer nos roedores mortos com as mãos, usar luvas de proteção ou outras ferramentas, se disponíveis. O produto contém um agente amargante e um corante.
NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO: PT/DGS bbp-129/2019
LOTE E DATA DE FABRICO: Ver embalagem

Titular da Autorização:
impex EUROPA S.L.
Avda. de Pontevedra, 39
36600 Villagarcía de Arosa (Po) España
Telf. 986 501 371 - Fax 986 506 916
www.impexeuropa.es

Comercializado em Portugal por:
QUELMER
Rua dos Bem-Lembrados 141
Manique 2645-471 Alcabideche
Tel.: 21 968 18 61 -Fax.: 21 968 19 37

8413707071631

PRODUCTOS IMPEX EUROPA

BRODY®
ISCO FRESCO - RODENTICIDA
BRODIFACUME 0,0025%

Atenção

NOVA CONCENTRAÇÃO

PRODUCTOS IMPEX EUROPA

BRODY®

ISCO FRESCO - RODENTICIDA

BRODIFACUME 0,0025%

RODENTICIDA
USO NÃO PROFISSIONAL

- ELIMINA RATOS E RATAZANAS COM UMA INGESTÃO
- BRODIFACUME 0,0025%
- PRONTO A USAR

CONTEÚDO LÍQUIDO: 150 g (contendo saquetas de 10 g)

MUITO APETECÍVEL PARA RATOS E RATAZANAS
CONTÉM AGENTE AMARGANTE PARA PESSOAS E ANIMAIS

PRODUCTOS IMPEX EUROPA

BRODY®
ISCO FRESCO - RODENTICIDA
BRODIFACUME 0,0025%