

COMPOSIÇÃO: Bromadiolona 0,0029%

Advertências de Perigo e Recomendações de Prudência: H373 - Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P103 - Ler o rótulo antes da utilização. P260 - Não respirar as poeiras. P280 - Usar luvas de protecção. P314 - Em caso de indisposição, consulte um médico. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente, assim como os animais mortos, como um resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor, por gestor autorizado de resíduos.

TIPO DE PRODUTO: TP 14 - Rodenticidas.

ORGANISMOS ALVO: *Mus musculus* e *Rattus norvegicus* adultos e juvenis.

CAMPOS DE UTILIZAÇÃO: Interior e envolvente de edifícios.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO: O produto é colocado no mercado em saquetas ou em grãos soltos, mas deve ser sempre aplicado em estações de isco devidamente rotuladas. O produto pode ser fornecido em estações de isco seladas e não recarregáveis.

Ratos: estações de isco com 60g de produto por cada 5 - 10m. Se for necessário mais de uma estação de isco, a distância mínima entre as estações de isco deve ser de 5-10 metros.

Ratazanas: estações de isco com 100g de produto por cada 5 - 10 m. Se for necessário mais de uma estação de isco, a distância mínima entre as estações de isco deve ser de 5-10 metros.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: As estações de isco devem ser verificadas, pelo menos a cada 2-3 dias (ratos) ou 5-7 dias (ratazanas) no início do tratamento passando a semanalmente, a fim de verificar os iscos consumidos pelos roedores, o estado de conservação das estações de isco e remover os roedores mortos. Repor ou substituir os iscos sempre que necessário. Colocar as estações de isco em zonas não sujeitas a inundações. Substituir os iscos que tenham sido danificados com água ou contaminados com sujidade. Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo e seguir as instruções apresentadas ou indicadas no ponto de venda. Antes da utilização do produto, devem ser considerados métodos de controlo não químicos, por exemplo: ratoeiras. Remover alimentos facilmente alcançáveis pelos roedores (por exemplo: grãos ou resíduos de alimentos). Para além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois perturba a população de roedores e dificulta o consumo dos iscos. As estações de isco devem ser colocadas nas zonas próximas onde a activação do roedor foi observada (por exemplo, caminhos, locais de nidificação, buracos, fendas, etc.). Se possível, as estações de isco devem ser fixas ao pavimento ou outra superfície. Não abrir as saquetas com isco. Colocar as estações de isco fora do alcance das crianças, pássaros, animais de estimação ou outros animais não-alvo do produto. Colocar as estações de isco afastadas de alimentos, bebidas, rações, assim como de utensílios ou superfícies que possa estar em contacto. Não colocar as estações de isco perto de sistema de drenagem de água, onde possa entrar em contacto com a água. Durante o manuseamento do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e as áreas de pele expostas, após aplicação do produto. Remover o restante isco ou estações de isco no final do tratamento.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO: Considerar medidas de controlo preventivo (tapar aberturas, remover alimentos e bebidas para o mais longe possível, melhorando a ingestão do produto e reduzir uma re-infestação. Não usar o produto como isco permanente (por exemplo, para prevenir o aparecimento de roedores ou detectar a actividade de roedores). A utilização deste produto deve eliminar os roedores em 35 dias. Em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (isto é, continua a observar-se actividade de roedores), o utilizador deverá consultar o fornecedor do produto ou serviço de controlo de pragas. Os roedores mortos devem ser removidos em intervalos frequentes durante o tratamento, pelo menos quando as estações de isco são verificadas e/ou substituídas. Eliminar os roedores mortos em conformidade com a regulamentação em vigor. O produto deve ser utilizado em estações de isco involáveis.

DETALHES SOBRE OS EFEITOS DIRETOS OU INDIRETOS PROVÁVEIS, INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS E MEDIDAS DE EMERGÊNCIA PARA PROTEGER O AMBIENTE: O produto contém uma substância anticoagulante. Se ingerido, os sintomas podem fazer-se evidentes num prazo de 72h. As manifestações clínicas podem incluir hemorragia nasal e das gengivas. Em situações mais graves, pode surgir sangramento nas fezes e na urina. **Antídoto:** Vitamina K1 administrada pelo médico/veterinário.

- Em caso de: - Contacto com a pele, lavar a pele com água e de seguida com água e sabão. - Contacto com os olhos, lavar os olhos com água, manter as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos. Não esquecer de retirar as lentes de contacto, se tal lhe for possível. - Em caso de ingestão, lavar a boca com água abundante. Nunca dar nada na boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Se ingerido, procurar ajuda médica e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto e consulte o centro antiveneno (808 250 143). Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal. **NÃO DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.**

SE NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA DISPONÍVEL O RÓTULO OU A EMBALAGEM DO PRODUTO E CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL: 808 250 143). No contacto com o Centro de Informação Antivenenos, informar o nº de autorização do produto, o nome comercial do produto e a substância activa. Se possível, providenciar uma cópia do rótulo ou da ficha de dados de segurança.

As estações de isco devem ser rotuladas com a seguinte informação: "Não mover ou abrir"; "contém rodenticida"; "Nome e autorização do produto"; "Identificação da substância activa"; e "Em caso de incidente contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel. 808250143". Perigoso para a vida selvagem.

INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO SEGURA DO PRODUTO E DA SUA EMBALAGEM: No final do tratamento, eliminar os iscos não consumidos e a embalagem em conformidade com a regulamentação em vigor. Nas etiquetas das estações de isco deve-se indicar o seguinte: Eliminar as estações de isco, no fim do seu tempo. Recomenda-se o uso de luvas de protecção.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto na sua embalagem original, fechada, em local fresco, seco e bem ventilado. Manter a embalagem fechada e afastada da luz solar directa. Manter o produto fora do alcance das crianças, pássaros, animais domésticos e outros animais. O produto biocida é estável durante 24 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES: Devido ao seu modo de acção demorado, os rodenticidas anticoagulantes levam 4-10 dias para ser eficaz após o consumo do isco. Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos com as mãos, usar luvas de protecção ou outras ferramentas, se disponíveis. O produto contém um agente amargante e um corante.

CATEGORIA DE UTILIZADORES: Público em geral (não profissional)

Número da autorização: PT/DGS/ARMPB--nac-108/2016

Lote e data de fabrico: Ver embalagem

Titular da Autorização:
 **impex EUROPA S.L.**
 Avda. de Pontevedra, 39
 36600 Vilagarcía de Arosa (Po) España
 Telf. 986 501 371 - Fax 986 506 916
 www.impexeuropa.es

Comercializado em Portugal por:

 **QUELMER**
 Rua dos Bem-Lembrados 141
 Matosinhos 2645-471 Alcabideche
 Tel.: 21 968 18 61 - Fax.: 21 968 19 37

8413707069690



Atenção





NOVO

RATIBROM 2

CEREAL DOMÉSTICO



MAIOR ATRAÇÃO


Em saquetas individualizadas de 25g microperfuradas prontas a usar



EMBALAGEM DE **150g**
(COM 6 SAQUETAS DE 25g)

Fabricado em Espanha

**MUITO APETECÍVEL PARA RATOS E RATAZANAS
 MATA COM APENAS UMA INGESTÃO
 CONTÉM AMARGANTE PARA REPELIR PESSOAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS**



**EM SAQUETAS
 INDIVIDUALIZADAS DE 25g
 MICROPERFURADAS
 PRONTAS A USAR**