

**COMPOSIÇÃO:** Bromadiolona 0,005 %.

**TIPO DE PRODUTO:** TP 14 – Rodenticidas.

**ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:** H360D: Pode afectar o nascituro. H372: Afecta os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.

**ORGANISMOS ALVO:** Ratos (*Mus musculus*) e Ratazanas (*Rattus norvegicus*).

**MÉTODOS DA APLICAÇÃO:** Isco em pellet pronto a usar. Colocar no interior de estações de isco resistentes, invioláveis e devidamente rotuladas. Providenciar o mesmo nível de protecção para humanos e animais não alvo do produto.

**CAMPOS DE UTILIZAÇÃO:** Interior e envolvente de edifícios. Ratos (Interior): Estações de isco com até 60-100g de produto a cada ponto. Ratazanas (Interior e envolvente de edifícios): Estações de isco com até 100 - 200g de produto a cada ponto.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Uso exclusivo por utilizadores profissionais. Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo e qualquer outra informação que acompanhe o produto ou tenha sido providenciada no ponto de venda e seguir as instruções apresentadas. Realizar um levantamento prévio ao tratamento na área infestada e uma avaliação no local, de forma a identificar as espécies de roedores, os locais de actividade e determinar a causa provável e a dimensão da infestação. Remover alimentos facilmente alcançáveis pelos roedores (por exemplo: grãos ou resíduos de alimentos). Para além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois perturba a população de roedores e dificulta o consumo dos iscos. O produto só deve ser utilizado como parte do sistema de gestão integrada de pragas (IPM), incluindo entre outros, medidas de higiene e, se possível, métodos físicos de controlo. As estações de isco devem ser colocadas nas zonas próximas onde a actividade do roedor foi observada. Utilizar em estações de isco invioláveis e fixas ao pavimento ou outra estrutura. Quando o produto é utilizado em zonas públicas, as áreas tratadas devem estar sinalizadas durante o período de tratamento e junto às estações de isco deve existir um sinal de aviso informando do risco de envenenamento primário ou secundário provocado pelo anticoagulante, assim como das medidas de primeiros-socorros a tomar em caso de envenenamento. O isco tem de estar protegido, de forma a não ser removido para fora da estação de isco. Colocar as estações de isco afastadas de alimentos, bebidas, rações, assim como de utensílios ou superfícies que possa estar em contacto. Usar luvas de protecção resistentes a produtos químicos durante a manipulação. Durante o manuseamento do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e as áreas de pele expostas, após aplicação do produto. A frequência das visitas às áreas tratadas é estabelecida pelo operador, em conformidade com o levantamento realizado no início do tratamento. Essa frequência deve ser coerente com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas. Se a quantidade de iscos consumidos for reduzida relativamente à dimensão da infestação, considerar a realocação das estações de isco para mais locais e a possibilidade de alterar a formulação do isco. Se após um período de tratamento de 35 dias, os iscos continuarem a ser consumidos e não for observada uma redução da actividade dos roedores, a causa provável tem de ser identificada. Quando outros elementos têm de ser excluídos, é provável que existam roedores resistentes pelo que deve ser considerado a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou um rodenticida anticoagulante mais forte. Deve também ser considerada a utilização de ratoeiros como medidas de controlo alternativas. Colocar o isco nas estações utilizando um dispositivo de dosagem. Especificar os métodos para minimizar a poeira e a exposição das mãos. Remover o restante isco ou estações de isco no final do tratamento.

**MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO:** Se possível, antes do tratamento informar as pessoas/transeuntes (p.e. utilizadores da área a tratar ou da sua envolvente) relativamente à campanha de controlo de roedores. O produto só pode ser fornecido a utilizadores profissionais, devidamente certificados e com formação adequada. Quando colocadas estações de iscos próximas de águas de superfície (p.e. rios, lagos, diques, canais de irrigação) ou sistemas de drenagem de água, garantir que o isco não entra em contacto com água. Considerar métodos preventivos de controlo (por exemplo: ratoeiras, remover alimentos e bebida o mais afastado possível) para reforçar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de re-infestação. Para reduzir o risco de envenenamento secundário, os roedores mortos devem ser removidos em intervalos frequentes durante o tratamento, em conformidade com as recomendações fornecidas pelo código de boas práticas. Só utilizar o produto no interior e em lugares não acessíveis a crianças e a animais não-alvo do produto. Não utilizar rodenticidas contendo substâncias activas anticoagulantes como iscos permanentes para prevenir o aparecimento de roedores ou detectar a actividade de roedores. Não utilizar em áreas onde existam suspeitas de resistência à substância activa. Não aplicar este produto diretamente nas tocas. Os utilizadores devem rotular devidamente as estações de isco com as seguintes informações: "não mover ou abrir"; "contém rodenticida"; "nome e autorização do produto"; "identificação da substância activa" e "em caso de incidente, contactar o Centro de Informação Antiveneno, Tel. 800 250 250".



NOVO

# RATIBROM 2

## PELLET PRF

Isco em pellet pronto a usar.

FABRICADO EM ESPANHA



Conteúdo líquido:

5 Kg

MUITO APETECÍVEL PARA RATOS E RATAZANAS  
ELIMINA COM APENAS UMA INGESTÃO

O produto não deve ser utilizado por mais de 35 dias sem ser realizada uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento. Não alternar iscos contendo diferentes substâncias activas anticoagulantes de eficácia igual ou mais fraca para efeitos de gestão da resistência. Para utilização alternada, considerar a utilização de rodenticidas não-anticoagulantes, se possível, ou um anticoagulante mais forte. Não lavar as estações de isco ou outros utensílios utilizados nos pontos de isco cobertos ou protegidos, com água entre aplicações. Eliminar os roedores mortos através de um gestor de resíduo perigosos autorizado, em conformidade com a regulamentação em vigor. Recomenda-se como método a incineração.

**DETALHES SOBRE OS EFEITOS DIRETOS OU INDIRETOS PROVÁVEIS, INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS:** O produto contém uma substância anticoagulante. Se ingerido, os sintomas podem fazer-se evidentes num prazo de 72 horas. As manifestações podem incluir hemorragia nasal e das gengivas. Em situações mais graves, pode surgir hematomas ou sangramento nas fezes e na urina.

**Antídoto:** Vitamina K1 administrada por um médico/veterinário. Em caso de contacto com a pele, lavar a pele com água e de seguida com água e sabão. Em caso de contacto ocular, lavar os olhos com água ou com líquido dos olhos, mantendo as pálpebras abertas, durante pelo menos 10 minutos. Em caso de ingestão, enxaguar a boca com água cuidadosamente. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito.

**NÃO DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA. SE NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA DISPONÍVEL O RÓTULO OU A EMBALAGEM DO PRODUTO E CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL: 800 250 250).**

Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal. Perigoso para a vida selvagem.

No contacto com o Centro de Informação Antivenenos, informar o nº de autorização do produto, o nome comercial do produto e a substância activa. Se possível, providenciar uma cópia do rótulo ou da ficha de dados de segurança.

**INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO:** No final do tratamento, eliminar os iscos não consumidos e a embalagem através de um gestor de resíduos perigosos autorizado, em conformidade com a regulamentação em vigor. É recomendado como método de tratamento a incineração. Recomenda-se o uso de luvas de protecção. Eliminar as estações de isco, no fim do seu tempo de vida útil, como resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor.

**INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM:** Armazenar o produto na sua embalagem original, fechada, em local fresco, seco e bem ventilado e afastado da luz directa do sol. Armazenar em local afastado das crianças, pássaros, animais domésticos e outros animais. Prazo de validade: 24 meses.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:** Devido ao seu modo de acção demorado, os rodenticidas anticoagulantes levam 4-10 dias para serem eficazes após o consumo do isco. Os roedores podem ser portadores de doenças. Não mexer nos roedores mortos com as mãos, usar luvas de protecção ou outras ferramentas, se disponíveis. O produto contém um agente amargante e um corante.

**RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:** P201- Pedir instruções específicas antes da utilização. P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. P260: Não respirar as poeiras. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 - Usar luvas de protecção. P314: Em caso de indisposição, consulte um médico. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente, assim como os animais mortos, como um resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor, por gestor autorizado de resíduos.

**NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO:**  
PT/DGS bbs151/2019

**LOTE E DATA DE FABRICO:** Ver embalagem




Títular da Autorização e Responsável

Impex EUROPA S.L.

Avda. de Pontevedra, 39  
36600 Vilagarcía de Arosa (Po) Espanha  
Tel. 986 501 371 • Fax 986 506 916  
www.impexeuropa.es

Perigo



Comercializado em Portugal:



Rua dos Bem-Lembrados 141  
Manique 2648-471 Alcabideche  
Tel.: 21 968 18 61  
Fax.: 21 968 19 37